

<b>Wirtschaftlichkeitsziele nach § 2 – Zielquoten Leitsubstanzen</b>		
Arzneimittelgruppe	Leitsubstanzen	Leitsubstanzquote in DDD (%)
HMG-CoA-Reduktasehemmer	Simvastatin, Pravastatin	79,7
Selektive Betablocker	Bisoprolol, Metoprolol	88,8
Alpha-Rezeptorenblocker zur Behandlung der BPH	Tamsulosin	88,0
Selektive Serotonin-Rücknahme-Inhibitoren	Citalopram, Sertralin	71,7
Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose	Alendronsäure, Risedronsäure	80,1
ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren	Enalapril, Lisinopril, Ramipril	73,1
ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren in Kombination mit Diuretika bzw. Calcium-Antagonisten	Enalapril, Lisinopril, Ramipril jeweils mit Diuretikum/HCT bzw. Amlodipin und Nitrendipin	46,9
Schleifendiuretika	Furosomid und Torasemid	99,0
Calcium-Antagonisten	Amlodipin, Nitrendipin	82,3
Nichtselektive Monoamin-Rückaufnahmehemmer	Amitriptylin, Doxepin	57,3

<b>Wirtschaftlichkeitsziele nach § 2 - Verordnungshöchstquoten</b>	
Arzneimittelgruppe	Verordnungshöchstquote in DDD (%)
Anteil von ezetimibhaltigen Arzneimitteln einschließlich Kombinationen an der gesamten Gruppe von HMG-CoA-Reduktasehemmer und ezetimibhaltigen Arzneimitteln	3,9
Anteil von GLP-1-Analoga an der Gesamtgruppe der Antidiabetika exklusive Insulin	2,7
Opiode: Anteil der transdermalen Darreichungsformen an den oralen und transdermalen Darreichungsformen	40,0

<b>Wirtschaftlichkeitsziel nach § 2 - Verordnungsmindestquoten</b>	
Arzneimittelgruppe	Verordnungsmindestquote in DDD (%)
Opiode: Anteil der generikafähigen an allen BtM-pflichtigen, oralen Darreichungsformen	74,0
Anteil von biosimilaren Erythropoetin an der gesamten Gruppe der Erythropoese-stimulierenden Wirkstoffe	50,2
Infliximab – biosimilares Infliximab	6,0